27-NOV-2009
2009-4137

GARDEX CHEMICALS LTD.

GARDEX BUG-KILL MAXX

DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE: Tétraméthrine 0,20%
Perméthrine 0,20%

Nº D'HOMOLOGATION 27861 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION **POISON**

ATTENTION IRRITANT OCULAIRE

CONTENU NET: 2L

GARDEX CHEMICALS LTD.
7 Meridian Road
Etobicoke, ON M9W 4Z6
(TÉL): 1-800-561-7302

MODE D’EMPLOI

BIEN AGITER AVANT L’EMPLOI. TENIR LE CONTENANT DROIT.

À UTILISER DANS ET AUTOUR DE LA MAISON

TRAITEMENT LOCALISÉ:
Pour tuer les fourmis, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les lépismes agenté, les cloportes communs et les araignées:
Pulvériser les endroits où les parasites se trouvent ou peuvent se cacher, y compris les coins sombres des pièces et des armoires, les fissures et les crevasses dans les murs, le long des plinthes et des cadres de fenêtres et de portes, derrière et sous les éviers, les cuisinières, les réfrigérateurs et les armoires et autour des poubelles, de la plomberie et autres installations de services publics. Il faut pulvériser directement les parasites qui s’échappent des cachettes. Pour les fourmis, appliquer sur les traînées de fourmis, autour des portes et des fenêtres et à tout endroit où ces parasites peuvent pénétrer. Répéter au besoin.

Pour tuer les puces et les tiques sanguines: Appliquer comme traitement localisé aux endroits infestées tels que les lits d’animaux et les endroits de repos, les fentes et les crevasses, le long et derrière les plinthes, les cadres de fenêtres et de portes et les endroits précis sur le plancher et les revêtements de plancher où ces parasites peuvent être présents. Il faut retirer la vieille litière et la remplacer avec de la litière propre et fraîche après le traitement. **NE PAS PULVERISER LES ANIMAUX DOMESITQUES AVEC CE PRODUIT.** Pour une suppression efficace des puces et des tiques, il faudrait combiner le traitement de l’animal à la désinfection et au nettoyage de tout endroit utilisé par l’animal. Passer l’aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles, etc. (jeter le sac de l’aspirateur après l’avoir utilisé), et laver la litière de l’animal, les endroits où il demeure et les environs.

Mouches et moustiques: N’utiliser qu’à l’extérieur comme aide à fin de réduire la nuisance qu’occasionnent ces insectes. Pulvériser les surfaces extérieures des cadres de portes et de fenêtres de même que d’autres endroits où ces parasites peuvent pénétrer dans la maison. Pulvériser aussi les coins sombres et les endroits de repos localisés (tels que sous les gouttières) ou les vérandas, patios et garages où ces insectes se rassemblent. Les mouches et les moustiques venant se reposer sur les surfaces traitées seront tués. Répéter le traitement au besoin.

LES FENTES ET LES CREVASSES:
Pour tuer les fourmis, les tiques sanguines, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les puces, les lépismes argenté, les cloportes communs et les araignées:
Pulvériser directement en petites quantités dans les fentes et les crevasses. Un réglage de repérage (les fentes et les crevasses) de la pompe doit servir pour les points entre différents éléments de construction, entre l’équipement et les planchers, les ouvertures menant à des vides et des espaces creux dans les murs, les pieds et les bases d’équipement où les insectes mentionnés précédemment se cachent.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Dangereux si avalé. Peut provoquer une irritation des yeux ou de la peau. NE PAS RESPIRER LES VAPEURS. Bien se laver après la manipulation et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver les vêtements contaminés avec de l’eau chaude et du savon avant de les réutiliser. Ne pas porter des chaussures contaminés.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obteni r des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administrer un traitement symptomatique.

RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT:

Ce produit est toxique pour les poissons et les autres invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement à l’eau. Ne pas contaminer l’eau pendant le nettoyage de l’équipement ou l’élimination des déchets.

ÉLIMINATION:

Ne pas réutiliser le contenant vide. Le jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L’UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

****

+))